

Resumen quincenal sobre la actividad sísmica del volcán Misti N° 1404

Fecha y Hora: Lunes 03/03/2014 15:28Hrs.

Datos Generales



V. MISTI 5.822 msnm



Coordenadas:
Latitud -16°18'S
Longitud -71°24'O

Ubicación: Borde oeste de la cordillera occidental, a 17 km del centro de la ciudad de Arequipa.

Tipo de Volcán: Estratovolcán activo, de forma cónica.


Frecuentemente se observa fumarolas saliendo del fondo del actual cráter interno -de 550 m de diámetro - donde hay un domo tapón de lava, es el volcán **más peligroso del Perú**.

Actualmente contamos con una red de 8 estaciones sísmicas. Las señales llegan hasta Arequipa **en tiempo real**.

Situación actual: **En Reposo**




Sismograma de la estación MIS5 del día 21 Febrero.



Sismograma de la estación sísmica **MISE** del día 21 de Febrero, donde se muestra 09 horas de registro (10 - 19 horas UTC). Se observa un enjambre de muy pequeños sismos tipo VT (generados por ruptura de roca) y un sismo de tamaño regular. El más energético de estos sismos se registró 07:36 Hora Local (12:36 UTC).

Evaluación de la actividad sísmo volcánica hasta el día 28 de Febrero 2014



ACTIVIDAD SISMICA MÁS IMPORTANTE DE LOS ULTIMOS 15 DÍAS


En la segunda quincena de Febrero, se registraron 186 eventos sísmicos de los cuales, 27 son eventos tipo LP, 154 son eventos VT y 5 corresponden a episodios tremóricos de corta duración. Por tanto, en relación a la quincena anterior, la actividad sísmica aumento en un 17%.

Respecto de la actividad tremórica, su nivel corresponde a niveles habituales. Por otra parte, la energía sísmica se mantiene baja.

En resumen, como dato principal se reporta la ocurrencia de un enjambre de sismos de regular tamaño, y la actividad sigue siendo de nivel **bajo**.


La evolución de la actividad volcánica se está evaluando en el seno del Comité Científico convocado en sesión permanente para tal fin.

Los sismos volcánotectónicos o conocidos también como **VT**, son sismos del resultado del fracturamiento abrupto de las rocas que conforman la estructura interna de un volcán. Este fractura miento se produce debido a intensas presiones internas.



Los sismos denominados de Largo Periodo o **LP**, están asociados al paso de fluidos volcánicos como el magma, gas, vapor de agua y otros fluidos hidrotermales.

Estos sismos son el resultado de la presión que ejercen los fluidos cuando se movilizan en el interior del conducto volcánico o en grietas.



Los **tremores** son sismos de origen similar a los LP pero de gran duración, es decir pueden registrarse por minutos, horas o más. En periodos de no-erupción los tremores son de poca amplitud (poco energéticos). Pero aumentan considerablemente en duración y amplitud en tiempos de erupción, en cuyo caso es frecuente observarlos antes o inmediatamente después de las explosiones volcánicas.

