

REPORTE DE LA ACTIVIDAD SISMOVOLCÁNICA

Fecha y Hora : lunes, 08 de julio de 2013 - 17:01:38 Hrs.

Periodo: Semanal (Últimos 15 días).

Datos Geograficos



VOLCÁN UBINAS 5672m.s.n.m
 Latitud 16°22' S
 Longitud 70°54' O


Ubicación: A 70 km al NE de la ciudad de Arequipa, en el distrito de Ubinas, provincia Sánchez Cerro, Región de Moquegua.

Tipo de volcán: Estratovolcán activo, de forma cónica.

Con cerca de 24 erupciones en los últimos 5 siglos, es el volcán más activo del Perú, la última erupción se inició el día 20 de abril del 2006 con una explosión y posterior columna eruptiva de 3 km de altura.

Red sísmica telemétrica permanente de monitoreo volcánico

Bien controlado. El método sísmico es reconocido como el más apropiado para obtener una "fotografía interna" (vigilar lo que sucede al interior) de volcanes activos. Desde mayo del 2006 el IGP opera una estación sísmica (UB1) situada sobre el flanco NW del volcán Ubinas, que proporciona datos sísmicos en tiempo real. Actualmente operan también otras tres nuevas estaciones sísmicas (UB2, UB3 y UB4— ver figura de la derecha) facilitando el monitoreo y vigilancia de un nuevo proceso eruptivo.



Detalle de la Información Sismovolcánica

| FECHA | Número | | Duración Tremor (minutos) | ENERGÍA LIBERADA (Megajoule) |
|-------------|--------|----|---------------------------|------------------------------|
| | LP | VT | | |
| 16-jun-2013 | 15 | 4 | 0 | 13.00 |
| 17-jun-2013 | 7 | 3 | 0 | 19.00 |
| 18-jun-2013 | 0 | 0 | 0 | 39.00 |
| 19-jun-2013 | 2 | 1 | 0 | 15.00 |
| 20-jun-2013 | 2 | 0 | 0 | 62.00 |
| 21-jun-2013 | 0 | 0 | 0 | 81.00 |
| 22-jun-2013 | 5 | 5 | 0 | 15.00 |
| 23-jun-2013 | 3 | 2 | 0 | 20.00 |
| 24-jun-2013 | 1 | 0 | 0 | 17.00 |
| 25-jun-2013 | 2 | 2 | 0 | 46.00 |
| 26-jun-2013 | 3 | 1 | 0 | 26.00 |
| 27-jun-2013 | 15 | 19 | 0 | 6.00 |
| 28-jun-2013 | 23 | 14 | 0 | 9.00 |
| 29-jun-2013 | 19 | 15 | 0 | 7.00 |
| 30-jun-2013 | 9 | 12 | 0 | 9.00 |

Observaciones:

Las señales sísmicas originadas en áreas volcánicas son diversas y propias de cada volcán. Su seguimiento oportuno ayuda a pronosticar erupciones volcánicas. En el Misti se pueden distinguir tres tipos de señales principales:

VT (sismos Volcano-Tectónicos): estos reflejan el fracturamiento de roca en el interior del edificio volcánico debido a cambios bruscos de presión y temperatura. Duran algunos segundos. Este tipo de actividad es frecuente en cualquier volcán, pero su aumento considerable en número y energía puede ser indicio de preparación de un proceso eruptivo.

LP (sismos de Largo Periodo): estos reflejan el paso de fluidos (magma, gas o vapor de agua) calientes y presurizados, a través de los conductos internos del volcán. Duran pocos segundos. El seguimiento de este tipo de actividad es muy importante en el pronóstico de una erupción volcánica.

TREMOR: son sismos de origen similar a los LP pero de gran duración, es decir pueden registrarse por minutos, horas o más. En periodos de no-erupción los tremores son de poca amplitud (poco energéticos). Pero aumentan considerablemente en duración y amplitud en tiempos de erupción, en cuyo caso es frecuente observarlos antes o inmediatamente después de las explosiones volcánicas.

Información Adicional

ETAPAS DE UNA ERUPCIÓN

1-PREPARACION

En las profundidades del volcán, un magma rico en gas llena la cámara magmática. En superficie, el volcán se hincha, se registran sismos VT, aparecen fisuras, fuentes termales, fumarolas en cantidad, etc.

2- EXPLOSIÓN


Los gases escapan del magma y forman burbujas que ascienden por la chimenea. Al llegar cerca de la superficie (cráter) las burbujas explotan, provocando una fragmentación brutal, violenta, del magma.

La explosión proyecta partículas calientes de distinto tamaño, siendo las más finas las "cenizas", que son llevadas por el viento hasta grandes distancias.


3- FIN DE LA ERUPCIÓN

Se vacía la cámara magmática. Se derrumban las paredes de la chimenea, fragilizadas por las convulsiones de la fase explosiva.

PARTES DE UN VOLCÁN




¿Como medir la actividad volcánica?



El SISMÓMETRO capta las ondas sísmicas generadas al interior del volcán, y el REGISTRADOR las graba. En laboratorio, el sismólogo se encarga de descifrar su procedencia.

Actividad de los últimos 60 días



En la segunda quincena de Junio 2013, se observaron 106 eventos LP y 78 eventos VT. El comportamiento de tal actividad sísmica ha aumentado en un 92% con respecto a la quincena pasada, el promedio de ocurrencia diaria fue de 12 eventos por día. No hubo actividad tremórica y los tornillos tuvieron un promedio de ocurrencia de 1 evento por día (similar a la quincena pasada); los valores de energía se mantienen bajos. Por lo tanto la actividad se mantiene BAJA.